N-1650 AB CPPAP Inscription à la GUILLEMENET Œ Directeur-Gérant Imprimerie de la Station Poitou-Charentes

AVERTISSEMENTS 155N 0294 - 4650

AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES CHARENTE CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

3 ROUTE DE LA FORET BIARD 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02



Charente

BULLETIN N° 7 du 30 MARS 1983 (1/83)

LES PARCELLES SONT AU DEBUT MONTAISON : C'EST A CE STADE QU'IL FAUT SE PREOCCUPER DES MALADIES DU PIED ET DES PREMIERES MALADIES DU FEUILLAGE,

SITUATION DES CULTURES -

% PARCELLES MENACEES

Piétin-verse ou Rhizoctone	Septoriose	Rouille brune	Oīdium
5	65	50	24

- . Les maladies du pied sont actuellement menaçantes dans 5 % des parcelles seulement.
- . Les maladies du feuillage sont très développées : septoriose en toutes zones, rouille brune plus particulièrement en Nord-Charente et oîdium sur Cocagne et même Talent.

En outre, la douceur de l'hiver laisse prévoir un développement de la rouille jaune.

LA DECISION DES TRAITEMENTS tiendra compte des observations en culture :.

- pour les <u>maladies du pied</u>, sachez reconnaître la fusariose, qui ne nécessite pas de traitement.
- Si plus de 20 % des talles sont attaqués par le piétin verse (ou le rhizoctone) une protection contre cette maladie sera nécessaire au stade 1-2 noeuds. Choisir un produit polyvalent efficace sur septoriose et rouilles.
- * en l'absence de piétin verse, une protection contre les <u>maladies</u> du feuillage est à envisager. La rouille jaune est à combattre dès les premiers foyers. Contre la rouille brune et la septoriose, attendre un développement généralisé de la maladie sur la parcelle.

La note d'information blé plus n°3 vous aidera pour choisir les produits. En cas de doute sur l'identification des rouilles, consulter vos techniciens ou le Service de la Protection des Végétaux.

AGRICULTEURS STOCKEURS ... VEILLEZ AU GRAIN

L'hiver doux a favorisé les infestations d'insectes des grains. Visitez vos stocks, surtout à leur partie supérieure. Le cas échéant, prenez les mesures nécessaires : transilage, désinsectisation, livraison accélérée puis traitement des cellules.

Imprimé à la Station le 30 Mars 1983

PI